



断奶乳猪大采食的意义


- 乳猪短期停食(12小时),消化道萎缩28%(J.L.HARDE等2005)
- 断奶应激 → 停止采食 → 小肠养分不够 → 消化道萎缩, 小肠绒毛降低 → 吸收下降 → 生长受阻、腹泻;
- 断奶后生长受阻, 不是受限于生长潜力, 而是受限于有效的营养供应;
- 不采食、少采食是营养供应受阻的主要原因, 用饥饿(少给料)控制腹泻得不偿失, 会降低仔猪的抵抗力, 很容易导致僵残。

断奶后前3天采食量及增长情况

28日龄断奶后采食情况	基本不食	食少量	食多量	乐不思母乳
断奶后前3天采食量	120	240	300	650
断奶后前三日增重g/d	-35	-10	15	160

断奶对采食量的影响

平均干物质采食量 (g/头)



断奶后乳猪生长受阻管理因素

- 没有选用优质开口料，不食或少食；
- 人工少、很难做到少喂勤添精细饲养；
- 营养水平低、多吃少吃都易腹泻，管理难度加大；
- 饲喂奶粉，费时耗力，易腐败滋生蚊蝇，环境变差，疾病困扰。

佳腾丰“乐不思母”乳，轻松、高效解决痛点

不用预饲



(喂奶) 调奶



轻松便捷



产品特点及功效

- 富含鱼溶浆蛋白、乳制品，适口性好，大采食，三天可达650g以上，快速解除断奶应激，消除负增长；
- 真空包装，保持保鲜，无需教槽，投喂即食，省工省力，减少员工护理成本，提高劳动效率；
- 预处理原料，消化率高，大采食，营养供应充足，减少因营养不良引起的僵残和损失，增重显著。

